

Ambrocyma

Ambroxol HCL

Jarabe
Vía Oral

Composición:

Cada 5 mL de jarabe contienen:

Ambroxol HCL..... 15 mg

Vehículo c.s.p..... 5 mL

Propiedades

Ambrocyma es un jarabe transparente con sabor a fresa.

Indicaciones terapéuticas

Ambrocyma jarabe está indicado como expectorante y mucolítico en los procesos en los que se requiere aumentar la fluidez de las secreciones del tracto respiratorio, como sucede en el asma bronquial, diferentes tipos de bronquitis aguda, crónica, bronquitis espasmódica, asma bronquial, bronquiectasia, neumonía, bronconeumonía, rinitis, sinusitis, atelectasias por obstrucción mucosa, traqueotomía, en el pre y posquirúrgico de pacientes geriátricos.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al Ambroxol o a cualquiera de los componentes del producto. Hipersensibilidad a la bromhexina, úlcera péptica, embarazo (durante el primer trimestre) insuficiencia renal severa, insuficiencia hepática severa, tratamiento con anticoagulantes.

Reacciones secundarias y adversa

Ambroxol es generalmente bien tolerado. Se han descrito con poca frecuencia eventos adversos gastrointestinales como diarrea, dispepsia, pirosis, náusea, vómito, sequedad bucal o salivación. Con menos frecuencia se ha encontrado erupción cutánea, sequedad de vías respiratorias, rinorrea, estreñimiento o disuria.

Precauciones y Advertencias generales

Los niños menores de 2 años deben recibir Ambroxol bajo supervisión médica. Pacientes con insuficiencia renal o enfermedad hepática deberían reducir la dosis o aumentar el intervalo de administración de Ambroxol. Pacientes con el síndrome ciliar maligno podrían tener congestión por secreciones respiratorias. El uso concomitante con antitusígenos podría provocar la acumulación de secreciones respiratorias por inhibición del reflejo tusígeno. Lo mismo podría suceder en pacientes con compromiso neurológico de cualquier causa o con desórdenes neuromusculares. Los pacientes con antecedentes de úlcera péptica o trastornos convulsivos deberán recibir Ambroxol con precaución.

Posología

Vía de administración: Oral

Niños menores de 2 años: Ambroxol 15 mg/5 ml jarabe: 2.5 ml una o dos veces al día bajo estricta supervisión médica.

Niños 2 - 5 años: Ambroxol 15 mg/5 ml jarabe: 2.5 ml tres veces al día.

Niños > 5 años: Ambroxol 15 mg/ 5 ml jarabe: 5 ml dos o tres veces al día. Adultos:

Ambroxol 15 mg/5 ml jarabe: 10 ml tres veces al día por 2 - 3 días, y luego 5 ml tres veces al día.

Interacciones medicamentosas y de otro género

La administración de Ambroxol con antibióticos (amoxicilina, cefuroxima, macrólidos) durante el tratamiento de infecciones respiratorias puede aumentar la concentración del fármaco en el tejido pulmonar. El uso concomitante con antitusígenos podría provocar la acumulación de secreciones respiratorias por inhibición del reflejo tusígeno.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental

Puede producir irritación faríngea o del tracto digestivo superior, dolor abdominal, náusea, vómito o diarrea.

El tratamiento, además de las medidas de descontaminación gastrointestinal que se consideren pertinentes, es de soporte y de vigilancia de la función respiratoria. La diálisis no debería ser efectiva.

Conservación: Consérvese en un lugar fresco y seco por debajo de los 30°C. Protéjase de la luz y humedad.

Presentación: Caja conteniendo un frasco con 120 mL de Jarabe

Leyendas de protección:

Manténganse fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

Fabricado por los Laboratorios Cymacla, S.R.L., Santo Domingo Oeste, República Dominicana