

AZITROMICINA CYMACLA®

Capleta

Vía Oral

Composición:

Cada Capleta contiene:

Azitromicina Dihidrato.....524.0 mg

(Equivalente a Azitromicina base 500 mg)

Excipientes c.s.p..... 1 Capleta

Propiedades: Azitromicina Cymacla está compuesto por Azitromicina; antibiótico macrólido semisintético, que se deriva químicamente de la eritromicina por la inserción de un átomo de nitrógeno dentro del anillo de lactona. Posee amplio espectro contra bacterias grampositivas y gramnegativas aeróbicas y anaeróbicas.

Indicaciones terapéuticas: Azitromicina Cymacla está indicada para las infecciones causadas por organismos susceptibles: en infecciones del tractorespiratorio inferior incluyendo bronquitis y neumonía, en infecciones odonto/ estomatológicas, en infecciones del tracto respiratorio superior incluyendo sinusitis y faringitis / amigdalitis. (La penicilina es la droga usual de preferencia en el tratamiento de la faringitis por Streptococcus Pyogenes, incluyendo la profilaxis de la fiebre reumática.

La azitromicina es generalmente efectiva en la erradicación, de estreptococos de la orofaringe; Sin embargo, hasta el momento no hay información disponible que establezca la eficacia de la azitromicina y la subsiguiente prevención de la fiebre reumática)

Posología:

Vía de administración: Oral

Debe ser administrado en dosis única diaria.

Adultos: Para todas las indicaciones, a excepción de las enfermedades de transmisión sexual, 500 mg diarios durante 3 días.

Contraindicaciones: Historia de reacciones alérgicas a la azitromicina o a cualquier antibióticos macrólido.

Reacciones secundarias y adversa: La azitromicina es bien tolerada. Un bajo porcentaje de los pacientes han tenido efectos de tipo gastrointestinal (diarrea, malestar abdominal: dolor, cólicos, meteorismos, vómitos y nauseas). También se han detectado una elevación transitoria de las transaminasas hepáticas. Episodios de una leve reducción en el recuento de neutrófilos se observaron ocasionalmente en estudios clínicos; pero no se ha establecido relación causal con la azitromicina. También se han informado reacciones alérgicas que incluyen erupción cutánea, angioedema y anafilaxia.

Precauciones y Advertencias: Aunque es raro, el medico debe tener presente que existe el riesgo que se presenten reacciones de hipersensibilidad graves y potencialmente mortales. Al igual que ocurre con otros antibióticos, se pueden producir modificaciones en la flora bacteriana normal y conducir a sobreinfecciones. El uso concomitante con derivados del ergot tiene riesgo de producir ergotismo. No se dispone de información acerca del uso de azitromicina en pacientes con depuración de creatinina < 40 mL/ min, ni en pacientes con alteración hepática significativa. En cualquier caso, se debe realizar una evaluación del riesgo/ beneficio para la administración del medicamento en pacientes con alteración de la función hepática.

Interacciones medicamentosas y de otro género: Como no existen datos sobre posible interacción debe tenerse cuidado al administrar conjuntamente estas drogas.

Antiácidos: Los pacientes que reciben antiácidos, no deben hacer la toma simultáneamente.

- Cimetidina: La absorción de azitromicina no se altera si se administra cimetidina dos horas antes.
- Teofilina: No existen evidencias de Interacciones farmacocinéticas.
- Warfarina: Pueden coadministrarse, pero hay que controlar el tiempo de protrombina en forma continua.

Uso en embarazo y lactancia: Solo cuando no haya alternativa adecuadas disponibles.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental: No hay experiencia en casos de sobredosis de Azitromicina. Los síntomas típicos de sobredosis con antibióticos macrólidos incluyen náuseas, vómitos, diarrea y trastornos de la audición.

Tratamiento: En casos de ingestión masiva se recomienda el lavado gástrico y otras medidas de soporte.

Presentación: Caja conteniendo 50 Capletas.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco por debajo de 30°C. Protejase de la luz.

Leyendas de Protección: No se deje al alcance de los niños.

Literatura exclusiva para médicos.

Venta bajo receta médica.

Fabricado por los Laboratorios Cymacla, S.R.L., Santo Domingo, República Dominicana