

**Calacyma  
Cymacla  
Calamina y Oxido de Zinc  
Loción  
Vía Tópica**

**Composición:**

Cada 100 mL contienen:

Calamina.....	8 g.
Oxido de zinc.....	8 g.
Vehículo C.S.P.....	100 mL.

**Indicaciones terapéuticas**

Calacyma Cymacla Loción está indicado como Auxiliar en el tratamiento del prurito causado por piquetes de insectos, quemaduras solares leves, salpullido, dermatitis del pañal, dermatitis por contacto y otras irritaciones dérmicas menores.

La Calacyma Cymacla Loción ha mostrado su utilidad anti pruriginosa en lesiones inflamatorias subagudas después de la fase exudativa de ciertas enfermedades dermatológicas como la varicela.

**Contraindicaciones**

Idiosincrasia o hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. No se use en lesiones dérmicas infectadas. Si las molestias empeoran o persisten por más de siete días o se presentan recaídas, descontinúe su empleo y consulte a su médico.

**Precauciones y Advertencias generales**

- No se deje al alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos.
- Literatura exclusiva para médicos.

**Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia**

La amplia experiencia de uso de este producto, no ha mostrado evidencia de efectos dañinos o indeseables durante el embarazo.

Sin embargo, deberán evaluarse los posibles beneficios sobre los riesgos potenciales del empleo de CalacymaCymacla Loción durante el embarazo como con cualquier otro medicamento.

No hay evidencia de que los principios activos se excreten a través de la leche humana.

**Reacciones secundaria y adversa**

Cuando se forman costras duras del producto que por descuido no son removidas en un tiempo adecuado, puede producirse una irritación de la zona afectada, en este caso suspender la aplicación del medicamento y colocar una ligera capa de glicerina.

**Interacciones medicamentosas y de otro género**

El empleo simultáneo de CalacymaCymacla Loción con alcohol tópico incrementa la acción desecante de la calamina; el propilenglicol favorece la remoción de las escamas hiperqueratóticas.

**Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental**

Administrado por esta vía no se han presentado casos de sobredosificación. En caso de ingesta accidental proporcionar medidas de sostén o inducir vómito o en su caso lavado gástrico.

**Posología**

**Vía de administración:** Tópica

**Niños mayores de 2 años y adultos:** Aplicar la Loción en el área afectada cada 6 a 8 horas al día.

Antes de su aplicación lave el área afectada con agua y jabón neutro, seque perfectamente la piel antes de la aplicación la Loción.

**Niños menores de 2 años:** Se deberán evaluar los posibles beneficios sobre los riesgos potenciales.

**Calacyma Cymacla Loción:** Caja conteniendo un frasco con 120 mL de Loción.

**Conservación:** Consérvese en un lugar fresco y seco por debajo de los 30°C. Protejase de la luz y humedad.

**Leyendas de protección:**

Manténganse fuera del a alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

**Fabricado por los Laboratorios Cymacla, S.R.L., Santo Domingo Oeste, República Dominicana**