

**Calacyma - D**  
**Cymacla**  
**Calamina, Óxido de zinc y difenhidramina**  
**Loción**  
**Vía Tópica**

**Composición:**

Cada 100 mL contienen:

Difenhidramina HCL.....	1 g
Calamina.....	8 g
Óxido de zinc.....	8 g
Vehículo C.S.P.....	100 mL

**Indicaciones Terapéuticas**

Calacyma Cymacla-D Loción está indicado como auxiliar en el tratamiento del prurito causado por piquetes de insectos, quemaduras solares leves, salpullido, dermatitis del pañal, dermatitis por contacto y otras irritaciones dérmicas menores.

La calamina ha mostrado su utilidad anti pruriginosa en lesiones inflamatorias subagudas después de la fase exudativa de ciertas enfermedades dermatológicas como la varicela.

**Contraindicaciones**

Idiosincrasia o hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. No se use en lesiones dérmicas infectadas. Si las molestias empeoran o persisten por más de siete días o se presentan recaídas, descontinúe su empleo y consulte a su médico.

**Precauciones Generales:**

- No se deje al alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos.
- Literatura exclusiva para médicos.

**Reacciones Secundarias y Adversas:**

Cuando se forman costras duras del producto que por descuido no son removidas en un tiempo adecuado, puede producirse una irritación de la zona afectada, en este caso suspender.

**Interacciones Medicamentosas Y De Otro Género**

El empleo simultáneo de Calacyma Cymacla-D Loción con alcohol tópico incrementa la acción desecante de la calamina; el propilenglicol favorece la remoción de las escamas hiperqueratóticas.

**Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental:** No se han reportado casos de sobredosificación, en caso de ingesta se debe inducir vómito o en su caso lavado gástrico.

**Posología**

**Vía De Administración:** Tópica.

**Niños mayores de 2 años y adultos:** Aplicar Calacyma Cymacla - D Loción en el área afectada cada 6 a 8 horas a día.

Antes de su aplicación lave el área afectada con agua y jabón neutro, seque perfectamente la piel antes de la aplicación de Calacyma Cymacla - D Loción.

**Niños menores de 2 años:** Se deberán evaluar los posibles beneficios sobre los riesgos potenciales.

**Modo de Uso**

Lavar y limpiar el área y aplicar directamente a la zona afectada cutáneas cuantas veces sea necesario. Si aparece irritación anormal suspenda su uso.

**Conservación:** Consérvese en un lugar fresco y seco por debajo de los 30°C. Protejase de la luz y humedad.

**Presentación:** Caja conteniendo un frasco con 120 mL de loción

**Leyendas de Protección:**

**No se deje al alcance de los niños.**

**Venta con receta medica**

**Agítese bien antes de usarse**

Fabricado por los Laboratorios Cymacla, S.R.L., Santo Domingo Oeste, República Dominicana