

Cymaferrol – Forte

Fumarato Ferroso, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B12 y Ácido Fólico

Capletas Recubiertas

Vía Oral

Composición:

Cada Capleta Recubierta contiene:

Fumarato Ferroso.....	320 mg
(Equivalente a 104mg de Hierro).	
Vitamina B1.....	2.0 mg
Vitamina B6.....	0.5 mg
Vitamina B12.....	10 mcg
Ácido Fólico.....	1 mg
Excipientes c.s.p.....	1 Capleta

Descripción: Capletas Recubiertas medianas de color rojo

Indicaciones terapéuticas: Cymaferrol-Forte está indicado para todos aquellos padecimientos anémicos que, por su origen, requieran sustitución de hierro, ácido fólico y vitaminas del complejo B. Las concentraciones de hierro y de ácido fólico son las indicadas para tratar estados carenciales tanto fisiológicos (embarazo) como patológicos. Además, por su fórmula es un suplemento ideal para aquellos padecimientos que requieran vitaminas del complejo B como estados de desnutrición de diversa índole.

Contraindicaciones: Cymaferrol -Forte no debe ser indicado en casos de Anastomosis digestiva, úlcera gástrica, hemocromatosis y hemosiderosis.

Precauciones y Advertencias generales: Las Capletas de Cymaferrol – Forte no deben usarse cuando existan casos de hemocromatosis, hemosiderosis, talasemia, o hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. Debe administrarse con precaución y bajo indicación médica cuando existan las siguientes afecciones médicas: Alcoholismo, hepatitis, colitis ulcerosa, úlcera gástrica y carcinoma de estómago.

Reacciones secundaria y adversa: Al tomar Cymaferrol- Forte puede observarse una coloración oscura en las heces fecales lo cual carece de importancia. Ocasionalmente con la dosis terapéutica, las sales de hierro pueden producir molestias epigástricas, pirosis, náuseas, cólicos intestinales y diarrea, aunque algunas veces puede producir constipación.

Interacciones medicamentosas y de otro género: El Fumarato ferroso con tetraciclina forma quelatos, disminuyendo la absorción tanto del antibiótico como del hierro. Los antiácidos que contienen carbonato de calcio, hidróxido de aluminio, compuestos con fósforo, fitatos, sales de calcio y las tetraciclinas disminuyen o retardan la absorción del hierro.

El ácido fólico de la fórmula puede bloquear la acción del metotrexato y sulfas. La vitamina B12 ve disminuida su absorción cuando es asociada con biguanidas. Cuando se asocia con colchicina y neomicina se produce una malabsorción.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental: La ingestión de dosis muy altas puede causar hipervitaminosis que desaparece al suspender o adecuar el medicamento. Se observa especialmente en los niños especialmente en los niños por ingestión de dosis masivas por error o por accidente, se presenta palidez, mareos, baja de la presión arterial pudiendo llegarse al shock que puede ser mortal. El tratamiento consiste en dar eméticos, lavados gástricos y administración de bicarbonato de sodio y leche. Administración de drogas antidiarreicas y sobre todo diferoxamina o edetato cálcico disodico.

Posología

Vía de administración oral

Adultos: 1 Capleta 3 veces al día, preferiblemente entre las comidas, ya que la administración conjunta con alimentos disminuye la absorción del hierro.

Conservación: Consérvese en un lugar fresco y seco por debajo de los 30°C. Protéjase de la luz y humedad.

Presentación: Caja conteniendo 30 y 100 Capletas recubiertas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

No se deje al alcance de los niños.

Literatura exclusiva para médicos

Venta bajo receta medica

Fabricado por los Laboratorios Cymacla, S.R.L., Santo Domingo Oeste, República Dominicana