

# CYMAFERROL

## JARABE MULTI-VITAMINICO

### VIA ORAL

#### Composición:

Cada 5 mL de Jarabe contienen:

Citrato de Hierro Amoniacal.....	0.01g
Al 28%	
Clorhidrato de Tiamina (Vit. B1) .....	0.015 mg
Clorhidrato de Piridoxina ( Vit.B6) .....	0.01 mg
Cianocobalamina (Vit B12) .....	0.01 mcg
Vehículo c.s.p.....	5 mL.

**Descripción:** Cymaferrol es un Jarabe de color oscuro con olor característico.

**Indicaciones terapéuticas:** Cymaferrol Jarabe es un auxiliar en las deficiencias de los componentes de la fórmula, que junto con una sana alimentación, ayuda en el crecimiento y desarrollo físico y mental de niños y adolescentes y a prevenir la carencia de vitaminas y minerales.

Cymaferrol Jarabe También está indicado en anemia ferropénica. Proporciona un esfuerzo nutricional para toda la familia. Durante los años de rápido crecimiento. En caso de inapetencia. Cuando el niño se muestra apático y se fatiga fácilmente. Cuando la dieta la ha sido restringida por cualquier razón. En hombre y mujeres de edad madura. En casos de desnutrición, anorexia, convalecencia de enfermedades infecciosas y en pacientes que hayan estado sometidos a prolongadas o elevadas dosis de medicación sulfamídica o antibiótica.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula e insuficiencia renal.

**Precauciones y advertencias generales:** Cymaferrol Jarabe no se recomienda administrar concomitantemente con productos que contengan vitamina A o D. No se recomienda en pacientes con desórdenes en el metabolismo del calcio.

**Reacciones secundaria y adversa:** Pueden presentarse náuseas, vómitos y diarrea.

**Interacciones medicamentosas y de otro género:** Alopurinol: Posible exceso de acumulación de hierro en el hígado. Los antiácidos disminuyen su absorción.

Cloranfenicol y la colestiramina: Disminuyen el efecto del hierro.

El aceite mineral y los sequestradores de sales biliares disminuyen la absorción de las vitaminas liposolubles en tratamientos a largo plazo. La tiamina y piridoxina son degradadas por el alcohol. La asociación de piridoxina con cicloserina, hidralacina e isoniacida compite con el piridoxal. Los anovulatorios orales aumentan la secreción de piridoxina y asociando la penicilina se forma un complejo con piridoxal, que la inactiva.

#### **Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental**

En caso de ingesta accidental, se podrían presentar síntomas de hipervitaminosis de vitamina D, en cuyo caso se recomienda inducir vómito o efectuar lavado gástrico y aplicar medidas generales. En caso de sobredosificación (50 ml diarios) por periodos prolongados, podrían presentarse síntomas de toxicidad crónica como vómito, dolor de cabeza, somnolencia y diarrea, que remitirán al adecuar la dosis o suspender el tratamiento.

#### **Posología**

**Vía de administración:** Oral

Niños desde 1 a 3 años: una cucharadita (5 mL) 1 o 2 veces al día; desde 4 años hasta la adultez: una cucharadita (15 mL) 1 o 2 veces al día. Adultos: una cucharadita (15 mL) 3 veces al día.

**Cymaferrol Jarabe:** Caja conteniendo un frasco con 240 mL de jarabe.

**Conservación:** Consérvese en un lugar fresco y seco por debajo de los 30°C. Protejase de la luz y humedad.

**Leyendas de protección:** Manténganse fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

Fabricado por los Laboratorios Cymacla, S.R.L., Santo Domingo Oeste, República Dominicana