

PROMAXIL
TABLETAS
CLORPROMAZINA
VIA ORAL

Composición:

Cada Tableta contiene:

Clorpromazina.....100 mg

Excipientes c.s.p.....1 Tableta

Descripción: Promaxil son Tabletas redondas blancas.

Indicaciones terapéuticas: Promaxil Tabletas está indicado como **neuroléptico:**

Psicosis agudas, psicosis crónicas, estados hipomaniacos y maniacos, síndromes contusionales, cuadros esquizofrénicos especialmente esquizoparanoicos, delirios crónicos, manifestaciones agresivas en niños y adultos, estados de excitación en seniles y débiles mentales.

Contraindicaciones: Depresión de la médula ósea.

Comas barbitúricos y/o alcohólicos, glaucoma, prostatitis, consumo de bebidas alcohólicas, hipersensibilidad a las fenotiacinas, discrasias sanguíneas, insuficiencia hepática y renal, arteriosclerosis cerebral, hipotensión o hipertensión arterial, epilepsia no tratada y parkinsonismo.

Precauciones y advertencias generales:

Advertencias: Como con otros neurolépticos, en muy raras ocasiones se han reportado casos de prolongación del intervalo QT.

Precauciones: En individuos que manejen vehículos y/o maquinaria.

Reacciones Secundarias y adversas:

Hipotensión arterial, depresión miocárdica, síncope, discinesia, eritema, urticaria, fotosensibilidad, discrasias sanguíneas, convulsiones, tortícolis, síndrome extrapiramidal, acatisia, rigidez, sialorrea, hipotensión ortostática, sedación y/o somnolencia, sequedad de boca, retención urinaria. Constipación y aun ileo paralítico.

Síndrome neuroléptico maligno: Las manifestaciones son: hipotermia, palidez, síntomas neurovegetativos; en presencia de cualquiera de ellos es imperativo suspender el medicamento.

Este síndrome se puede presentar con todos los neurolépticos.

Prolongación del intervalo QT.

Priapismo (rara vez ha sido reportado en pacientes tratados con Clorpromazina).

Interacciones medicamentosas y de otro género:

Potencialización del efecto de los hipotensores, de los antihipertensivos, de los depresores del SNC y de los hipnóticos, tranquilizantes, anestésicos y analgésicos. Los antiácidos disminuyen la absorción del neuroléptico, el antiácido se debe administrar por lo menos una hora antes o dos horas después del neuroléptico. Con litio se puede presentar desorientación.

La ictericia colestásica y el daño hepático, principalmente de tipo colestásico o mixto, se han reportado en raras ocasiones en pacientes tratados con Clorpromazina.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental:

Depresión del SNC hasta sueño profundo, hipotensión y síntomas extrapiramidales. Otras manifestaciones incluyen: agitación, convulsiones, fiebre, cambios en el ECG, arritmias. Tratamiento: Los eméticos no son aconsejables por la acción antiemética propia del producto. La inducción del vómito puede provocar una reacción distónica de la cabeza a la nuca, lo que puede provocar una aspiración del vómito. Los síntomas se pueden tratar con agentes anti parkinsonianos anticolinérgicos. Si se requiere un vasoconstrictor, adminístrese norepinefrina o fenilefrina, no se emplee epinefrina. Trátese preferentemente en medio hospitalario especializado

Posología

Vía de administración: Oral

Tabletas de 100 mg: Adultos: de media a dos tabletas por día, o según el criterio del médico.

Promaxil Tabletas: Caja conteniendo 30 Tabletas.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco por debajo de 30°C. Protejase de la luz.

Leyendas de protección: Manténganse fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

Fabricado en Los Laboratorios Cymacla, S.R.L., Santo Domingo, Republica Dominicana.